

NIHSS

Date :

Examineur :

1A – Niveau de conscience

- 0 = vigilance normale, réponses aisées
1 = non vigilant, mais réveillable par stimulation mineure pour répondre et exécuter des consignes
2 = non vigilant, requiert des stimulations répétées pour rester éveillé ou obtenir un mouvement non stéréotypé
3 = mouvements stéréotypés, réponds de façon réflexe ou totalement aréactif.

1B- Réponse à 2 questions

 (exemples: Quel âge avez-vous?; Où habitez vous?; Quel mois sommes nous?)....

- 0= réponds correctement aux 2 questions ;
1 = ne réponds correctement qu'à une seule question
2= ne réponds correctement à aucune des questions (stupeur ou aphasie = 2)

1C- Réponse à 2 ordres

 (ex : ouvrir et fermer les yeux ; serrer le poing ; lever la main)

- 0 = exécute les 2 ordres correctement
1 = exécute un seul ordre correctement sur les 2
2 = n'exécute aucune tâche

2- Motricité oculaire

 (seuls les mouvements horizontaux sont évalués)

- 0 = normal
1 = paralysie partielle, limitation du regard (sur un œil ou les 2); sans déviation forcée ni paralysie complète
2 = déviation tonique ou paralysie totale du regard (non surmontée par les réflexes oculo-céphaliques)

3- Champ visuel

- 0 = normal
1 = quadrantanopsie (ou extinction visuelle ou hémianopsie partielle)
2 = hémianopsie totale
3 = double hémianopsie, incluant cécité corticale

4- Paralysie faciale

- 0 = mobilité normale et symétrique
1 = paralysie mineure (pli naso-génien affaissé / sourire asymétrique)
2 = paralysie faciale centrale totale (paralysie totale ou presque de la partie inférieure de la face)
3 = PF complète (territoire inférieure et supérieure) ou bilatérale

5- Motricité du membre supérieur

 (à 45° en décubitus).....

- 0 = pas de chute (> 10 secondes)
1 = discrète chute, incomplète, avant 10 secondes, sans heurter le lit
2 = effort contre pesanteur possible mais le bras ne peut tenir (/ atteindre) la position et chute sur le lit avant 10 sec
3 = ébauche de mouvement, absence d'effort possible contre gravité
4 = absence de mouvement

5b - MSG.....

5a - MSD.....

x= mb amputé, articulation douloureuse ou bloquée

6- Motricité du membre inférieur

 (tendu à 30° pendant 5 secondes).....

- 0 = pas de chute (> 5 secondes)
1 = discrète chute, incomplète, avant 5 secondes, sans heurter le plan du lit
2 effort contre pesanteur possible, mais le MI ne peut tenir (/ atteindre) la position et chute sur le lit avant 5 sec
3 = ébauche de mouvement, absence d'effort contre gravité
4 = absence de mouvement

6a - MID.....

6b - MIG.....

x= mb amputé, articulation douloureuse ou bloquée

7- Ataxie des membres

 (yeux ouverts ; n'est comptabilisée que si hors de proportion par rapport au déficit moteur)...

- 0 = absence (ou non testable)
1 = existe pour un membre
2 = existe pour 2 membres

8- Sensibilité

 (sensibilité à la piqûre ou réaction de retrait après stimulus nociceptif)

- 0 = normale
1 = déficit discret / modéré (le patient sent que la piqûre est atténuée ou abolie, mais il a conscience d'être touché)
2 = anesthésie (il n'a pas conscience d'être touché)

9- Langage

 (nommer un objet, décrire une image)

- 0 = normal
1 = aphasie discrète à modérée (perte de fluence / compréhension diminuée(s) sans limitation des idées exprimées)
2 = communication impossible (expression fragmentée; nécessite des efforts de la part de l'examineur pour déduire)
3 = mutisme, aphasie globale (aucun langage utile ni compréhension du langage oral possible)

10- Dysarthrie

- 0 = articulation normale
1 = dysarthrie discrète ou modérée (bute sur certains mots, mais reste compréhensible)
2 = sévère (inintelligible en absence (ou disproportionnée) avec une éventuelle aphasie)

11- Extinction ou négligence

- 0 = absence d'anomalie
1 = extinction/négligence visuelle, tactile ou spatiale à la stimulation bilatérale simultanée
2 = hémignégligence/extinction à plus d'une modalité sensorielle; ne reconnaît pas main/ s'oriente vers un seul ½ espace

Score NIHSS total :

.....

